

## QUESTÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS:

**Questão 1:** Cada equipe de Saúde da Família, conforme proposto pelo Ministério da Saúde na Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) deve se responsabilizar pelo acompanhamento de, no máximo:

- A) 1000 pessoas.
- B) 2000 pessoas.
- C) 3000 pessoas.
- D) 2500 pessoas.
- E) 4000 pessoas.

**Questão 2:** Para facilitar o uso da agenda pelo profissional de saúde e pela equipe de recepção da Unidade de Saúde, cada situação no agendamento é marcada com uma cor diferente no PEC/E-SUS. Ao concluir o agendamento dos cidadãos, a agenda do PEC exibirá na lista de horários os cidadãos agendados, diferenciando por cores os tipos de agendamento. A alternativa que apresenta, corretamente, a cor e o tipo de agendamento/atendimento é:

- A) Cor azul: cidadão em escuta inicial.
- B) Cor verde: cidadão em atendimento.
- C) Cor roxa: cidadão chegou à unidade e está aguardando atendimento.
- D) Cor rosa: cidadão agendado.
- E) Cor azul-escuro: cidadão com atendimento finalizado.

**Questão 3:** No que se refere às Leis Orgânicas do SUS é correto afirmar que:

I. A Universalidade significa que o SUS deve atender a todos que contribuem com o INSS, sem distinção ou restrição;

II. As Conferências Municipais de Saúde são convocadas para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde de 3 anos em 3 anos;

III. É irrelevante para a saúde o contexto social, cultural, econômico e de educação da população.

- A) Estão corretas as alternativas I e II.
- B) Estão corretas as alternativas I e III.
- C) Somente a alternativa II está correta.
- D) Somente a alternativa I está correta.
- E) Todas as alternativas estão incorretas.

**Questão 4:** Em relação aos profissionais que compõem a equipe mínima da Estratégia de Saúde da Família, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), marque a alternativa correta:

- A) Médico, enfermeiro, psicólogo e agente comunitário de saúde;
- B) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde;
- C) Médico, enfermeiro, dentista e técnico de enfermagem;
- D) Médico, enfermeiro, dentista e fisioterapeuta;
- E) Médico, enfermeiro, dentista e assistente social.

**Questão 5:** A saúde como direito de todos e dever do estado tem sua base legal sustentada por:

- A) Parecer 163/82 e Resolução 04/72;
- B) Lei 2604/55 e decreto-lei 50387/61;
- C) Lei 7498/86 e decreto-lei 94406/87;
- D) Constituição Federal de 88 e Lei 8080/90;
- E) Parecer 271/62 e Portaria Ministerial de 04/2012.

**Questão 6:** O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU - parte integrante da Política Nacional de Atendimento às Urgências, trata-se de um serviço pré-hospitalar, que visa conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam e com a maior brevidade possível. Considerando a necessidade de classificação de risco para organização dos atendimentos, identificamos o princípio do SUS de:

- A) Universalidade.
- B) Descentralização.
- C) Equidade.
- D) Integralidade.
- E) Hierarquização.

**Questão 7:** Paciente do sexo masculino chega à Unidade de Saúde da Família para consulta. Durante o atendimento, o paciente informa que veio à unidade pois está com dor de cabeça há 3 dias.

No prontuário eletrônico - PEC/ E-SUS será necessário registrar esta informação do paciente. Considerando o manual do PEC/E-SUS, que dispõe sobre o SOAP, em qual campo do sistema (PEC/ E-

SUS) o profissional deve inserir esta informação trazida pelo paciente?

- A) Avaliação.
- B) Plano.
- C) Subjetivo.
- D) Objetivo.
- E) Motivo da consulta.

**Questão 8:** A lei nº 8142/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Em relação a esta lei NÃO é correto afirmar que:

- A) Ela estabelece que o SUS contará com duas instâncias colegiadas: as Conferências e os Conselhos de Saúde.
- B) As Conferências com a representação dos vários segmentos sociais avaliam a situação da saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos municípios, estados e no país.
- C) Os Conselhos de Saúde são os órgãos de controle do SUS pela sociedade e se constituem exclusivamente no nível federal.
- D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- E) Os Conselhos de Saúde funcionam como colegiados, de caráter permanente e deliberativo.

**Questão 9:** Quanto à atenção básica, avalie as asserções que se seguem e a relação proposta entre elas.

I – O processo de trabalho e o modelo de atenção no SUS devem ser transformados em relação aos modelos de atenção centrados no hospital, quando se incorpora a estratégia de territorialização.

PORQUE

II – O método da territorialização possibilita compreender as condições específicas em que vive determinada população, considerando, inclusive, seu perfil de saúde-adoecimento, bem como os recursos e serviços com os quais interage.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

**Questão 10:** A Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde estabelece que a Estratégia de Saúde da Família deve ter “caráter substitutivo” em relação à rede de atenção básica tradicional. Isso significa :

- A) a substituição dos profissionais de saúde por médicos generalistas.
- B) que o Ministério da Saúde terá, gradativamente, uma maior participação na assistência à saúde da população.
- C) a implantação de um novo modelo assistencial no país.
- D) a troca de um enfoque preventivo para um enfoque curativo.
- E) a implantação de uma gestão exclusiva para equipes de Saúde da Família em nível municipal.

## QUESTÕES ENFERMEIRO:

**Questão 11:** O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo, constituindo a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento. No Brasil, a estratégia preconizada para o rastreamento do câncer de mama é a mamografia. Baseado no que é proposto pelo Ministério da Saúde em “Protocolos de Atenção Básica – Saúde das Mulheres”, assinale a alternativa correta:

- A) A categoria BIRADS 3 é considerada como resultado negativo, não indicando alteração na rotina de rastreamento.
- B) A categoria BIRADS 0 é considerada como resultado inconclusivo, com risco para câncer indeterminado, necessitando de avaliação adicional.
- C) A história familiar da mulher representa o único fator de risco para Câncer de mama, cerca de 40% das mulheres com história familiar de parentes de primeiro grau também vão desenvolver este tipo de câncer.
- D) A categoria BIRADS 1 é considerada como achado provavelmente benigno, necessitando acompanhamento radiológico a cada seis meses no primeiro ano.
- E) A partir dos 40 anos todas as mulheres devem fazer mamografia, anualmente.

**Questão 12:** A coleta de exame citopatológico deve fazer parte da rotina de mulheres da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde como a principal estratégia para detecção precoce do câncer de colo uterino, sendo assim, sobre a periodicidade de realização do exame citopatológico de colo do útero, assinale a alternativa correta baseando-se no que é proposto pelo Ministério da Saúde em “Protocolos de Atenção Básica – Saúde das Mulheres”:

- A) Deve ser realizado em mulheres de 18 a 70 anos, anualmente, quando o resultado for negativo.
- B) Deve ser realizado em mulheres de 25 a 64 anos, a cada dois anos, independente do resultado.
- C) Deve ser realizado em mulheres de 25 a 64 anos de idade, uma vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos normais, a cada três anos.
- D) Deve ser realizado em mulheres de 20 a 60 anos, a cada três anos.
- E) Independente do resultado, deve ser realizado anualmente para mulheres que já iniciaram a vida sexual.

**Questão 13:** O acesso ao cuidado do pré-natal no primeiro trimestre da gestação tem sido incorporado como indicador de avaliação da qualidade da Atenção Básica, sendo fundamental o envolvimento de toda a equipe para a assistência integral à gestante. Considerando o disposto em “Protocolos de Atenção Básica – Saúde das Mulheres”, assinale a alternativa INCORRETA sobre o momento adequado para avaliação dos itens abaixo no pré-natal de baixo risco:

- A) Após a 12ª semana é possível medir a altura uterina da gestante.
- B) As consultas de pré natal devem ser mensais até a 28ª semana, quinzenais da 28ª a 36ª semana e semanais a partir da 36ª semana.
- C) O teste rápido para sífilis ou VDRL deve ser realizado no 1º trimestre e no 3º trimestre.
- D) O exame de Coombs indireto deve ser solicitado após a 24ª semana para todas as gestantes com fator Rh +.
- E) O batimento cardíaco fetal (BCF) pode ser verificado com um sonar a partir da 10ª a 12ª semana de gestação.

**Questão 14:** Um adolescente do sexo masculino de 15 anos de idade chegou sozinho e muito apreensivo à Unidade de Saúde da Família, sendo encaminhado à enfermeira. Durante a consulta de enfermagem, após o acolhimento e por meio de escuta qualificada, o adolescente relatou que não usa preservativo em suas relações sexuais e que tem o sexo oral como prática sexual habitual. Ao exame físico da cavidade oral, foram encontradas inúmeras cáries dentárias. A enfermeira, durante a consulta de enfermagem, identificou fatores que contribuem para o aumento da vulnerabilidade às DST/HIV/AIDS, tais como o desconhecimento da transmissão das DST e do sexo seguro, além de exposição a fatores de agravos para sua saúde. Considerando a situação apresentada, avalie, entre as condutas descritas nos itens a seguir, as que devem ser adotadas pela enfermeira durante a consulta de enfermagem a esse adolescente.

- I. Prover materiais educativos sobre DST/AIDS; acompanhar a evolução dos problemas detectados e solicitar comparecimento do responsável para conclusão do atendimento.
- II. Orientar o adolescente sobre a necessidade de higienização oral, visando à prevenção de


cárie, e encaminhá-lo para tratamento odontológico.

- III. Encorajar a discussão sobre sexualidade e incentivar a participação do adolescente e dos parceiros em atividades educativas desenvolvidas na comunidade e na Unidade de Saúde da Família.
- IV. Orientar sobre as DST/HIV/AIDS e hepatites virais, com enfoque nas formas de transmissão, sinais e sintomas, comportamentos e atitudes de risco e formas de prevenção, com ênfase no sexo seguro.

É correto o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

Questão 15: Uma enfermeira atua na Estratégia Saúde da Família de um município e, entre suas responsabilidades, está o acompanhamento das crianças menores de 2 anos de idade. Uma das crianças de sua área não comparece à Unidade de Saúde da Família há 4 meses. É o primeiro filho de uma adolescente de 17 anos de idade, que escondeu a gravidez por muito tempo, iniciando o pré-natal aos 7 meses de gestação. A criança tem 8 meses de idade, nasceu com 38 semanas, pesando 2 200 g. Durante a avaliação do desenvolvimento, ao analisar o gráfico de peso por idade da criança, obteve o traçado a seguir.



Tendo por base os achados apresentados, avalie as afirmações a seguir.

- I. O gráfico revela que a criança nasceu com baixo peso, porém, devido à curva ascendente, pode-se classificar seu peso atual como normal para a idade.
- II. A criança pode ser classificada como muito baixo peso para a idade.
- III. A criança nasceu com peso adequado.

É correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 16: No mês de agosto é comemorada a Semana Mundial de Aleitamento Materno e na ocasião a equipe de uma Unidade de Saúde da Família decidiu abordar, em uma atividade de educação em saúde, o tema Aleitamento Materno e convidou algumas gestantes para participar da atividade. A enfermeira preparou uma apresentação e inseriu algumas informações-chave para serem abordadas. Dentre as informações apresentadas pela enfermeira, assinale aquela que NÃO está correta:

- A) São pontos-chave para o posicionamento adequado: rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo, corpo do bebê próximo ao da mãe, bebê com cabeça e tronco alinhados e bebê bem apoiado.
- B) São sinais indicativos de técnica inadequada de amamentação: bochechas encovadas a cada sucção, ruídos da língua, dor na mamada e mama deformada durante a mamada.
- C) Recomenda-se que a criança seja amamentada sem restrição de horários e de tempo de permanência na mama. É o que se chama de amamentação em livre demanda. Em geral um bebê em aleitamento materno exclusivo mama de oito a doze vezes ao dia.
- D) A pega inadequada não tem influência na produção de leite e não interfere no ganho de peso do bebê.
- E) Caso haja trauma mamilar, não se deve utilizar produtos que retiram a proteção natural do mamilo, como sabão, álcool ou qualquer produto secante.

Questão 17: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico

não requer tecnologia sofisticada e a doença pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na Atenção Básica. Um paciente do sexo masculino de 30 anos chega a Unidade de Saúde da Família para aferir sua pressão arterial, tem como resultado o valor de 140 x 90mmHg e relata que antes a pressão era sempre "normal". A técnica de enfermagem chama o enfermeiro que verifica que o paciente não apresenta sintoma de crise hipertensiva. Diante desta situação, qual deverá ser a conduta da enfermeira, conforme orientação do Caderno de Atenção Básica nº 37?

- A) Solicitar que o paciente retorne para duas novas medidas de PA com intervalo de uma ou duas semanas entre elas.
- B) Encaminhar o paciente para consulta médica no dia, pois a pressão elevada já indica o encaminhamento ao médico da Unidade para iniciar o tratamento medicamentoso.
- C) O paciente deve ser considerado normotenso, podendo retornar após dois anos para avaliar a PA.
- D) Encaminhar o paciente para o cardiologista para iniciar o tratamento com o especialista na área.
- E) Manter o paciente em observação na Unidade.

**Questão 18:** Considerando um bebê com 5 meses de idade que chega à Unidade de Saúde da Família para vacinar-se. Ao olhar a caderneta desta criança a enfermeira percebe que as vacinas estão em dia e que só será necessário fazer a(s) vacina(s) do 5º mês. Assinale a alternativa que corresponde a(s) vacina(s) que a criança tomará no dia:

- A) 1ª dose de Pneumo 10 e Meningo C.
- B) 2ª dose de Pentavalente, Antipoliomielite Inativada e Vacina Oral contra Rotavirus Humano.
- C) 1ª dose de Pentavalente, Antipoliomielite Inativada e Vacina Oral contra Rotavirus Humano.
- D) 2ª dose de Meningo C.
- E) 2ª dose de Pneumo 10.

**Questão 19:** O dispositivo intrauterino (DIU) de cobre constitui método de barreira muito utilizado e de boa eficácia, que pode ser indicado para toda e qualquer mulher, independente da idade. São efeitos adversos do DIU de cobre, EXCETO:

- A) Alterações no ciclo menstrual.
- B) Dor aguda na parte inferior do abdômen.
- C) Aumento do risco de câncer de colo uterino.

- D) Cólicas.
- E) Possibilidade de anemia.

**Questão 20:** A tuberculose (TB) continua a merecer especial atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. Ainda obedece a todos os critérios de priorização de um agravo em saúde pública, ou seja, de grande magnitude, transcendência e vulnerabilidade. Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de TB pulmonar são as principais medidas para o controle da doença. Sobre a tuberculose assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A baciloscopia direta é um método simples e seguro e deve ser solicitada aos pacientes que apresentem suspeita clínica e/ou radiológica.
- B) A baciloscopia de escarro deve ser realizada em, no mínimo, duas amostras.
- C) A vacina BCG é indicada para proteção contra formas mais graves de tuberculose na população menor de 5 anos.
- D) O controle de contatos deve ser realizado fundamentalmente pela Atenção Básica.
- E) É considerado contato toda pessoa que convive, exclusivamente, na mesma casa que o caso índice.